



पूर्वखोला गाउँपालिका

Purbakhola Rural Municipality

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

Office of the Rural Municipal Executive

पूर्वखोला, पाल्पा
Purbakhola, Palpa
५ नं. प्रदेश, नेपाल
5 No. Province, Nepal

पत्र संख्या/Letter No.: ०६६/०६६

चलानी नं./Ref.No.: ३३



मिति : २०७७/०१/३०

कृषक वर्गमा अनुरोध

केही समय यतादेखि मकै बालीको मुख्य शत्रुजीवको रूपमा पहिचान भएको अमेरिकन फौजी कीरा (Fallarmyworm: Order: Lepidoptera, Family: Noctuidae, Genus: Spodoptera, Species: *Spodoptera frugiperda*) यस पूर्वखोला गाउँपालिका, पाल्पाका विभिन्न स्थानहरूमा देखा पर्न थालेका छन्। यस कीराको लाभले मकै मात्र नखाई अन्य बालीहरू जस्तै धान, गहुँ, कोदो, उँखु, तेलहन बाली, तरकारी बालीहरू, भटमास, प्याज, आलु, आदि जस्ता बालीहरूलाई क्षति पुऱ्याउँदछ। मिचाह प्रवृत्तिको यस कीराले चाडै नै ठुलो क्षेत्रमा फैलिई ठुलो क्षति पुऱ्याउन सक्ने भएकोले पूर्वखोला बासी कृषकहरूलाई समयमा नै खेतबारीको नियमित अनुगमन गरी सचेत रहनु हुन तथा तपसिलमा उल्लेख गरिएका सो कीराबाट पुऱ्याउने क्षतिको लक्षणका आधारमा कीराको पहिचान गरी आवश्यक व्यवस्थापनका उपायहरू अपनाउनु हुन कृषि विकास शाखा, पूर्वखोला गाउँपालिकाको कृषक वर्गमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ।

क्षतिको लक्षण:

अण्डा वा फुलबाट भर्खर निस्किएको लाभे वा चिल्लाले पातको हरियो भाग कोतरेर खान्छ। फलतः पातहरूमा सेता धर्सा वा धब्बा देखिन्छन्। लाभेहरू बढ्दै जाँदा पातहरूमा प्वाल पार्दछन्। पातमा आलो विष्टा छोड्दछन्। यस कीराको लाभेले मकैको गुभोभिन्न पसेर समेत पात खाने गर्दछ। गुभो च्यातेर हेर्दा लाभेहरू देखिन्छन्। यसले मकैको धान चमर, घोगा र दाना समेत खाएर क्षति पुऱ्याउँदछ।

अमेरिकन फौजी कीराको फुल, लाभे, प्यूपा र वयस्कको पहिचान:

फुलबाट पहिचान

फुलको आकारको परिधि ०.४ मिलिमिटर तथा उचाई ०.३ मिलिमिटर हुन्छ। फुल पार्ने समयमा फुलको रंग दूधको रंग जस्तो हल्का पहेँलो रंगको हुन्छ। फुलबाट चिल्ला निस्कनु अगाडि फुलका रंग हल्का खैरा रंगका हुन्छन्। वातारणमा २० देखि ३०° सेल्सियस तापक्रम भएमा २-३ दिनमा फुलबाट चिल्ला निस्कन्छन्। फुलहरू पातको सतहमा (पातको तल वा माथि) १५०-२०० गोटासम्म २-४ तहमा खप्टिने गरी पार्दछन्। फुललाई बचाउन सुरक्षात्मक खैरा गुलाबी रंगका कल्लाले (पोथी मथले पेटबाट रगेटी उत्पादन गरी फुललाई ढाक्छ) छोपिएको हुन्छ। एक पोथीले १००० वटासम्म फुल पार्दछ। धेरै साना विरुवाको सन्दर्भमा माउले विरुवाको काण्डमा पनि फुल पार्न सक्छ।

लाभे वा लाभेबाट पहिचान

लाभेहरू हल्का हरियो देखि गाढा खैरा रंगका हुन्छन् र लम्बाई तर्फ धर्साहरू हुन्छन्। लाभेको छैठौँ अवस्थामा यसको आकार ४.५ सेण्टिमिटर लामो हुन सक्छ। लाभेको पेटको भागमा ८ जोडा भुट्टा खुट्टाहरू (प्रोलेग्स) तथा अन्तिम पेटको भागमा १ जोडा प्रोलेग्स हुन्छन्। भर्खर निस्किएका लाभेको शरीरमा हरियो रंग तथा काला धर्सा र धब्बाहरू देखिन्छन्। जब यी लाभेहरू बढ्दै जान्छन् तिनीहरूको रंग हरिया वा पहेँलो खैरो रंगमा बदलिन्छन् र शरीरको माथिल्लो भाग तथा स्पाइराकुलर तर्फ (पेटको सतह माथिको भाग) काला धर्साहरू देखिन्छन्। बढि संख्या तथा खानाको अभावको अवस्थामा छैठौँ अवस्थाका लाभेहरू करिव काला देखिन्छन्। ठुला लाभेको टाउको मा पहेँलो A आकार देखिन्छ र अन्तिम पेटको (एब्डोमिनल) खण्डमा ४ गोटा काला धब्बाहरू वर्गाकारमा देख्न सकिन्छ।

प्यूपाबाट पहिचान

हुकैका लाभे भन्दा प्यूपाको आकार छोटो (मेक्सिकोमा भाले: १.३-१.५ सेण्टिमिटर तथा पोथी: १.६-१.७ सेण्टिमिटर) र खैरा चमकदार हुन्छन्। प्यूपा बन्ने प्रक्रिया सामान्यतया माटोमा पुरा हुन्छ तापनि मकैको प्रजनन अंग सुल्लामा पनि प्यूपा बन्न सक्छ। माटो ज्यादै कडा भएमा लाभेले पातको टुक्राटुकी तथा अन्य वस्तुमा पनि रेशमी कोया बनाई त्यस भित्र लाभे प्यूपामा बदलिई बस्दछ। तापक्रम बढि हुने गर्मीको समयमा प्यूपाको अवधि ८-९ दिन रहन्छ भने तापक्रम कम हुने जाडो समयमा २०-३० दिन सम्म हुन जान्छ।

Kondal
३३

५६५५५
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

वयस्क भाले मथबाट पहिचान

वयस्क भालेको लम्बाई १.६ सेन्टिमिटर तथा पखेटाको लम्बाई ३.८ सेन्टिमिटर हुन्छ। अगाडिको पखेटा छिरबिरे रङ्गको हुन्छ (हल्का खैरो, फुसथप जानकारीका लागि पराले रंग) जसमा ३ भागमा हल्का खैरो पराले रंग तथा १ भागमा गाढा खैरो कट्ला हुन्छ र पखेटाको टुप्पा तथा मध्य भागमा त्रि-कोणीय सेता धब्बाहरु देखिन्छन्।

वयस्क पोथी मथबाट पहिचान

पोथीको शरीरको लम्बाई १.७ सेन्टिमिटर र पखेटाको लम्बाई ३.८ सेन्टिमिटर लामो हुन्छ। पोथी मथको अगाडिको पखेटाहरुमा कम स्पष्ट चिन्हहरु वा एकनासे फुस्रो खैरो देखि फुस्रो तथा खैरो सुन्दर छिरबिरे रंग देखिन्छ। पछाडीका पखेटाहरु किनारमा गाढाखैरो पराले रंगका हुन्छन्। वयस्कहरु रात्रीचर स्वभावका हुन्छन् र न्यानो तथा आद्र रातहरुमा अति सक्रिय हुन्छन्। फुल पार्नु पूर्व अबधिको ३-४ दिन पछि पोथी वयस्क मथले ४-५ दिनभित्र उसको जीवन अबधिमा पार्ने फुल पार्दछे तथा पनि केही फुल पार्ने कार्य ३ हप्तासम्म पनि चलि रहन्छ। वयस्क पोथीको सरदर बाँच्ने अबधि १० दिन भएतापनि यिनीहरु ७-२१ दिनसम्म बाँच्दछन्।


अमेरिकन फौजी कीराको व्यवस्थापन विधि:


- ◆ खेतबारीको नियमित अवलोकन गर्ने।
- ◆ पातमा देखिएका फुलको भुण्डलाई संकलन गरी फुल नष्ट गरिदिने।
- ◆ नेपियर जातको घाँसले यस कीरालाई आकर्षण गर्ने हुँदा खेतबारीको छेउछाउँमा यो जातको घाँस लगाई कीरा आकर्षण गरी मार्ने।
- ◆ खरानी, माटो र वालुवा एकै ठाउँमा मिसाई प्रभावित मकैको गुभोमा राख्ने।
- ◆ निम्न विषादीहरु उपलब्धताका आधारमा न्यायोचित रुपमा प्रयोग गर्ने :
 - निममा आधारित विषादी जस्तै मल्टिनिम ०.०३ % ई.सि. ५ एम.एल. प्रति लिटर पानीमा मिसाई छर्ने, वा
 - स्पिनोस्याड ४५% एस.सि. जस्तै ट्रेसर ०.३४ एम.एल. प्रति लिटर पानीमा मिसाई छर्ने, वा
 - ल्याम्डासाइहालोथ्रिन ५% ई.सि. जस्तै सिल्भा प्लस, कराते, ब्राभो, एभोन ०.५-०.७५ एम.एल. प्रति लिटर पानी, वा
 - इमामेक्टिन बेन्जोएट ५% एस.जि. जस्तै किङ्ग स्टार ०.५ ग्राम प्रति लिटर पानीमा मिसाई छर्ने, वा
 - क्लोरोपाइरिफस ५० % +साइपरमेथ्रिन ५ % २ एम.एल. प्रति लिटर पानीमा मिसाई छर्ने, वा
 - क्लोरएन्ट्रानिलीप्रोल १८.५ % एस.सि. १ एम.एल. प्रति लिटर पानीमा मिसाई छर्ने।

थप जानकारीका लागि सम्पर्क व्यक्ति:

१. कमानसिंह थापा मोवाईल नं ९८५७०६३५३७

२. सन्तोष कडेल मोवाईल नं ९८६७५५०९३०


 सन्तोष कडेल
 कृषि शाखा प्रमुख


 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

अमेरिकन फौजी कीराबाट पुर्‍याईने क्षतिको पहिचान तस्विरहरु



बनसक पोथीले १००-२०० जसमा पुग्न ठाम्रो पातको ताराहरूमा पार्छन् । चिल्ला निस्कने समयमा यी मुलहरू हरिमा रंगबाट हल्का खैरो रंगमा बदलिन्छन् ।




पोथी मथले पेटलाई थोडेर फाला निकाली मुलहरूलाई जुलाकाहरूमा छोप्छन् ।



मुलबाट चिल्ला निस्कनासाथ चिल्ला/साँसेले पात खान थुरु गर्छन् ।



बढ्दै गीठा साँसेहरू हल्का हरियो रंगबाट खैरो रंगमा बदलिन्छन् ।



पोथी कीराको साँसेको गीठमा २ खण्डमा Y गीठा फाला भन्नाहरू बगीकरामा देखिन्छन् ।



पोथी कीराको फालो टाउको अगाडि भागमा चर्को उल्टो Y आकार हुन्छ



साँसे २-४ से.मि. लामो हुँदा तलैभन्दा बढि मोक्कान पुर्‍याउँछन् ।



पुर्‍या चाल्कले खैरो रंगका हुन्छन् जुन प्रायतः माटो भित्र २-५ से.मि.मा पार्छन् ।



©Matt Bertone, North Carolina State University

बनसक मथहरू (साथि: पोथी, तल: माथो) । पोथी भएर माथो भएर छोरी उठ्दा भएछन् ।

फौजी कीराले मकैमा पुर्‍याएको क्षति



पातमा लाना साँसेले क्षति पुर्‍याउँछन् नर्भपारदर्शक भन्नाहरू वा प्वालहरू ।



लाना साँसेहरू देखी भागो निक्काली भुगुडिएको अवस्थामा, यी खनिजसँग यकी चिकनामा लर्न लक्छन्



पातको गुथीमा/गुईरामा क्षति पुर्‍याउँछे देखिएका प्वालहरू ।



चिकनाको फलामा पोथी कीराका साँसेहरू पात निस्कने गुथी तर्फ खानीउपमा बढ्छन् तथा मुलपातमा क्षतिको पहिचान गर्न सार्छो पार्छ ।



साँसेले पातको उपगीतखल र पातमा पुर्‍याएको प्वाल, भुगुडी र साँसेको चिप्टा ।



साँसेले प्रायतः बाँगाको किनारामा प्वाल पार्छन् ।



पोथी कीराको आक्रमणले सक्कैको धानचमर पुर्‍याउनु हुन्छ तथा गेडाको गुल्लार र उपपातमा क्षति ल्याउँछ ।



साँसेले खोपाको किनारामा बनाएको आसले गेडाका क्षति पुर्‍याउनुका लागि कुनै अवस्थामा पुर्‍याउँछ ।

